

## Notation des propriétés a »groécologiques

### FICHE APICOLE – POLLINISATEURS SAUVAGES

En noir les critères de la fiche apicole nationale

En violet ceux proposés pour les pollinisateurs sauvages par le groupe CVL

Nom de l'exploitation

<b>VALEUR APICOLE et POUR LES POLLINISATEURS SAUVAGES</b>							
<i>Capacité d'accueil du milieu (nectars, pollens, abris et zones de reproduction) pour les abeilles domestiques, bourdons, abeilles sauvages, syrphes et autres insectes pollinisateurs sauvages à diverses périodes de l'année</i>							
<b>Potentiel mellifère</b> <i>Diversité et abondance des floraisons des plantes mellifères</i>							
<b>Lié à la végétation de la parcelle</b>	Herbacées ou buissons	Oui	Moyen	Non			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Lié aux éléments fixes du paysage ou à l'environnement proche</b>	Haies, landes arbres, bois, zone humide, cultures, etc.	Oui	Moyen	Non			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Saisons favorables aux ressources mellifères</b> <i>Au regard de la végétation et de l'environnement*</i> <i>* se référer au tableau des espèces</i>		<input type="checkbox"/> Printemps <input type="checkbox"/> Eté <input type="checkbox"/> Automne <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Aucune					
<b>Diversité de formes sur l'ensemble de la saison pour répondre au besoin de l'ensemble des pollinisateurs</b> <i>Au regard de la végétation et de l'environnement*</i> <i>* se référer au tableau des espèces</i>		<input type="checkbox"/> Printemps <input type="checkbox"/> Eté <input type="checkbox"/> Automne <input type="checkbox"/> Hiver <input type="checkbox"/> Aucune					
<b>Contexte environnemental de la parcelle</b> <i>Abris, zone de reproduction...</i>							
<b>Dans la parcelle</b>	<u>Abris offerts par le couvert herbacé</u>	Oui	Moyen	Non			
	<input type="checkbox"/> Végétation hétérogène <input type="checkbox"/> Plusieurs strates dans l'herbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<u>Zones de nidifications potentielles</u>						
	<input type="checkbox"/> sol nu <input type="checkbox"/> zone recouverte par les eaux dans l'année						
<b>Aux abords de la prairie</b>	<u>Zones d'abris et de nidifications potentielles</u>	Oui	Moyen	Non			
	<input type="checkbox"/> Végétation hétérogène <input type="checkbox"/> Sol nu vertical <input type="checkbox"/> Sol nu horizontal <input type="checkbox"/> Bois mort <input type="checkbox"/> Lisière boisée <input type="checkbox"/> Strate arborée (haie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Contexte environnemental de la parcelle favorable pour les abeilles domestiques</b>	Ressource en eau, conditions climatiques, absence de pollutions locales, etc.	Oui	Oui, rude	Non			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Avis du Jury</b> Contexte environnemental de la parcelle abris, zone de reproduction		6	5	4	3	2	1

Proposition d'intégration de la thématique des pollinisateurs sauvages dans la fiche apicole

Déclinaison régionale du PNA FTP, Centre-Val de Loire

réalisée par Philippe Bourlet (Perche Nature), Célia Dujardin et Laura Moufti (Chambre agri. 41), Aurélie Poumailloux (CDPNE), François Pinet (PNR Brenne), Damien Pujol (CBNBP), Baptiste Hubert (Gretia), Caroline Le Bris et Axelle Marchant (Hommes et territoires), François Micheau et Frédéric Sanchis (DREAL CVL)

Pratiques agroécologiques							
Pratiques liées à la parcelle	Pratiques pour atténuer les effets de la fauche sur les pollinisateurs	Oui	Moyen	Non			
	Fauche tardive ou réflexion à l'échelle du territoire : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Pratiques liées aux abords de la parcelle	Pratiques pour favoriser l'accès aux ressources	Oui	Moyen	Non			
	Entretien des haies permettant une bonne floraison (fréquence, hauteur de coupe, date, matériel utilisé) : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Pas de haie Fauche des ourlets hors floraison : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Utilisation ou dérive de produits phytosanitaires aux abords de la prairie (chemin / ourlets...) : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Avis du Jury Pratiques agroécologiques		6	5	4	3	2	1

CALENDRIER MELLIFERE ET FORME DE LA COROLLE POUR AIDER A L'EVALUATION

	Printemps			Eté	Automne / Hiver
Parcelle Environnement					
Exemple de plantes mellifères, dans les herbages, selon les régions, en lien avec leur période de floraison (hors graminées) <b>en gras les ligneux</b> <u>Formes de la fleur</u> en vert les tubulaires, en rouge les plates, en bleu les épis	<b>Démarrage : buis</b> - <b>chèvrefeuille</b> - <b>cornouillers</b> - <b>cerisier</b> - - <b>noisetiers</b> - <b>merisiers</b> - <b>pissenlits</b> - <b>pommiers</b> - <b>pruniers</b> - <b>romarin</b> - <b>saules</b> - <b>tussilage</b>	<b>Début de printemps :</b> <b>bourdaine</b> - <b>cytise</b> - <b>épine-vinette</b> - <b>lavande</b> - <b>lotier</b> - <b>myosotis</b> - <b>myrtille</b> - <b>ronces</b> - <b>vesces</b>	<b>Fin printemps :</b> <b>aubépines</b> - <b>bourrache</b> - - <b>centaurées</b> - - <b>épervières</b> - <b>framboisiers</b> - <b>genêts</b> - <b>géraniums</b> - <b>houx</b> - <b>knauties</b> - <b>lamiacées</b> - <b>luzernes</b> - <b>myrtille</b> - <b>plantains</b> (pollen) - <b>poacées</b> (pollen) - <b>potentilles</b> - <b>robiniers</b> - <b>sainfoins</b> - <b>sauges</b> - <b>sorbiers</b> - <b>sureau</b> - <b>trèfles</b>	<b>Eté : bourrache - bruyères</b> - <b>campanules</b> - <b>carlines</b> - <b>centaurées</b> - <b>chardons</b> - <b>châtaignier</b> - <b>épilobes</b> - <b>framboisiers</b> - <b>géraniums</b> - <b>grande astrance</b> - <b>knauties</b> - <b>lamiacées</b> - <b>luzernes</b> - <b>mélisse</b> - <b>menthes</b> - <b>millepertuis</b> - <b>ombellifères</b> - <b>origan</b> - <b>potentilles</b> - <b>renouées</b> - <b>reine des prés</b> - <b>ronces</b> - <b>sainfoins</b> - <b>sarriettes</b> - <b>tamaris</b> - <b>thym</b> - <b>tilleul</b> - <b>vesces</b>	<b>Automne :</b> <b>centaurées</b> - <b>lierre</b> - <b>lotier</b> - <b>pissenlits</b> - <b>renouées</b> - <b>tamaris</b> - <b>trèfles</b>